


# 11: Wormer- en Jisperveld, Engewormer, Kalverpolder

Veldcoördinator: Marieke Stam

De Kalverpolder en de Engewormer bestaan voor een groot deel uit Staatsbosbeheerland en particulier natuurbeheer. In de Engewormer liggen slechts 4 percelen legselbeheer. Op dit legselbeheer zitten nauwelijks vogels. In het aangrenzende Wormer- en Jisperveld liggen een aantal clusters met veel weidevogelnesten. Het aantal nesten is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Helaas zijn aan de zuidzijde van Wormer, op enkele van de beste weidevogelpercelen, tientallen nesten gepreedeerd door een vos. Ook de hoek bij Oost-Knollendam had veel last van predatie, o.a. door een blauwe reiger die het op de kuikens had gemunt. De ganzen hielden het gras hier zo kort, dat de kuikens geen dekking vonden. In eerste instantie leken hier dan ook weinig kuikens groot te worden, maar dat is later in het seizoen weer deels goed gekomen door tweede legfels.

Aan de oostzijde van het Wormer- en Jisperveld hebben meerdere boeren water in de greppels laten lopen. Dat was hard nodig vanwege de droogte en heeft zeker een positief effect gehad op het broedsucces. Op die plekken was te zien dat daar nog laat in het seizoen kuikens rondliepen. Het maaien is veelvuldig uitgesteld, soms zelfs tot 1 juli aan toe.



## Engewormer

NH880AF gevonden legfels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Kievit	1	Kievit	1	1	0	100,0%
Scholekster	1	Scholekster	0	0	0	
	<u>2</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	
			% van bekend resultaat	100,0%	0,0%	
<b>Agrarisch natuurbeheer</b>						
oppervlakte waar ANLb mogelijk is		32,24 ha				
oppervlakte afgesloten ANLb		1,95 ha				
oppervlakte legselbeheer		1,95 ha				

## Wormer- en Jisperveld (Zuid)

NH880AG gevonden legfels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	22	Grutto	22	9	13	40,9%
Kievit	52	Kievit	52	30	22	57,7%
Meerkoet	6	Meerkoet	6	3	3	50,0%
Scholekster	21	Scholekster	21	5	16	23,8%
Slobeend	2	Slobeend	2	1	1	50,0%
Tureluur	12	Tureluur	12	9	3	75,0%
Wilde eend	5	Wilde eend	5	4	1	80,0%
	<u>120</u>		<u>120</u>	<u>61</u>	<u>59</u>	
			% van bekend resultaat	50,8%	49,2%	
<b>Agrarisch natuurbeheer</b>						
oppervlakte waar ANLb mogelijk is		154,1 ha				
oppervlakte afgesloten ANLb		107,84 ha				
oppervlakte legselbeheer		49,08 ha				
oppervlakte kuikenveld		7,37 ha				
oppervlakte verlenging rustperiode		20,31 ha				

## Wormer- en Jisperveld (Noord)

NH880AH gevonden legfels:		hiervan bekend resultaat:				
Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grauwe gans	3	Grauwe gans	3	1	2	33,3%
Grutto	42	Grutto	40	35	5	87,5%
Kievit	79	Kievit	70	50	20	71,4%
Knobbelzwaan	1	Knobbelzwaan	1	1	0	100,0%
Meerkoet	2	Meerkoet	2	2	0	100,0%
Scholekster	17	Scholekster	14	9	5	64,3%
Slobeend	9	Slobeend	9	7	2	77,8%
Tureluur	22	Tureluur	20	16	4	80,0%
	<u>175</u>		<u>159</u>	<u>121</u>	<u>38</u>	
			% van bekend resultaat	76,1%	23,9%	
<b>Agrarisch natuurbeheer</b>						
oppervlakte waar ANLb mogelijk is		605,57 ha				
oppervlakte afgesloten ANLb		253,00 ha				
oppervlakte legselbeheer		150,21 ha				
oppervlakte kuikenveld		7,63 ha				
oppervlakte verlenging rustperiode		14,28 ha				