


## 5: Eilandspolder, Mijzen

Veldcoördinator: Marieke Stam

In Oost-Graftdijk is vanwege corona minder actief naar nesten gezocht, met als gevolg dat er minder nesten zijn gevonden dan voorgaande jaren. Er is voldoende land met uitgestelde maaidatum en kruidenrijk grasland, echter de grutto's met kuikens leken toch voorkeur te hebben voor legselbeheerpercelen met wat langer gras.

De Graftermeer heeft een hoge dichtheid aan weidevogels en een goede mix van laat maaibeheer, legselbeheer en kuikenland. In het begin van het seizoen zijn aan de noordzijde van de Groeneweg meerdere nesten gepredeerd. Het plaatsen van een wildcamera heeft geen mogelijke predatoren opgeleverd. Vermoedelijk is het een zwerm meeuwen geweest vlak na het bemesten. De rest van het seizoen viel de predatie mee. Er heeft een telling van het broedsucces van de grutto plaatsgevonden. Dit was met 25% ver onder de maat (18 gruttogezinnen tegenover 71 broedpaar). Het is onbekend waarom het broedsucces zo laag is, mogelijk heeft droogte en voedselgebrek de kuikens hier parten gespeeld. Het kan ook zijn dat gruttogezinnen naar de Eilandspolder zijn overgestoken.

Wat erg leuk was, is dat er zich onverwachts een kolonie oeverzwaluwen heeft gevestigd in een hoop grond ten zuiden van de Groeneweg. In korte tijd waren er ca. 45 nestgangen gegraven in de hoop grond.



In Eilandspolder Zuid liggen veel percelen met laat maaibeheer. In de meeste percelen waren tot 8 of 15 juni kuikens aanwezig. Opvallend was dat sommige hoeken daarna ineens 'leeg' waren. Op legselbeheerpercelen is het aantal gevonden nesten vergelijkbaar met voorgaande jaren.

In Eilandspolder Oost liggen voornamelijk percelen met rustperiode of kruidenrijk grasland. Ook wordt een aantal percelen extensief beweid. De waterstand is er hoog. Veldleeuweriken doen het goed op de wat ruigere percelen. Tot minimaal 15 juni waren weidevogels met kuikens aanwezig, waaronder kluten. Omdat hier weinig naar nesten wordt gezocht is niet bekend of het aantal broedparen is toe- of afgenomen.

In Polder Mijzen is een mooi mozaiek aan beheervormen aanwezig en wordt maar op een klein gedeelte naar nesten gezocht. Het aantal nesten is vergelijkbaar met vorig jaar, maar er zijn dit jaar wel meer soorten gaan broeden. Voorheen vooral Kievit en scholekster, dit jaar zijn ook een grutto- en twee tureluurnesten gevonden. Er is weinig last van predatie en voldoende kruidenrijk grasland in de buurt voor de kuikens.

### Oost-Graftdijk

NH361AB gevonden legfels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	5	Grutto	0	0	0	
Kievit	2	Kievit	0	0	0	
Scholekster	1	Scholekster	0	0	0	
	<b>8</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

% van bekend resultaat

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	187,83 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	35,09 ha
oppervlakte legselbeheer	25,56 ha

### Graftermeer-Zuid

NH361AC gevonden legfels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	20	Grutto	20	19	1	95,0%
Kievit	46	Kievit	42	37	5	88,1%
Krakeend	1	Krakeend	0	0	0	
Meerkoet	2	Meerkoet	0	0	0	
Scholekster	8	Scholekster	6	6	0	100,0%
Slobeend	3	Slobeend	1	1	0	100,0%
Tureluur	9	Tureluur	7	6	1	85,7%
Wilde eend	2	Wilde eend	2	0	2	0,0%
	<b>91</b>		<b>78</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	

% van bekend resultaat 88,5% 11,5%

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	181,22 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	92,89 ha
oppervlakte legselbeheer	56,41 ha
oppervlakte kuikenveld	9,89 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	4,96 ha

## Eilandspolder-Zuid

### NH361AD gevonden legsels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Graspieper	1	Graspieper	1	1	0	100,0%
Grutto	26	Grutto	23	18	5	78,3%
Kievit	42	Kievit	34	20	14	58,8%
Scholekster	3	Scholekster	3	2	1	66,7%
Slobeend	2	Slobeend	2	2	0	100,0%
Tureluur	8	Tureluur	8	7	1	87,5%
Veldleeuwerik	1	Veldleeuwerik	1	1	0	100,0%
Wilde eend	2	Wilde eend	2	1	1	50,0%
	85		74	52	22	

% van bekend resultaat      70,3%      29,7%

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	375,64 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	122,03 ha
oppervlakte legselbeheer	42,59 ha
oppervlakte kuikenveld	5,27 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	47,53 ha
vrijwillige weidevogelbescherming	

## Eilandspolder-Oost

### NH458AA gevonden legsels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Meerkoet	4	Meerkoet	4	4	0	100,0%
Rietgors	1	Rietgors	0	0	0	
Scholekster	6	Scholekster	5	5	0	100,0%
	11		9	9	0	

% van bekend resultaat      100,0%      0,0%

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	246,42 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	142,11 ha
oppervlakte legselbeheer	13,72 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	55,85 ha

## Polder Menningweer

### NH458AB gevonden legsels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Scholekster	1	Scholekster	1	0	1	0,0%
	1		1	0	1	

% van bekend resultaat      0,0%      100,0%

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	45,27 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	18,43 ha
oppervlakte legselbeheer	7,36 ha

## Polder Mijzen (zuidelijk deel)

### NH458AA gevonden legsels:

Soort	Totaal	Soort	Bekend	Uit	Niet uit	% uit
Grutto	1	Grutto	1	0	1	0,0%
Kievit	4	Kievit	3	3	0	100,0%
Scholekster	2	Scholekster	2	1	1	50,0%
Tureluur	2	Tureluur	2	1	1	50,0%
	9		8	5	3	

% van bekend resultaat      62,5%      37,5%

#### Agrarisch natuurbeheer

oppervlakte waar ANLb mogelijk is	161,91 ha
oppervlakte afgesloten ANLb	40,63 ha
oppervlakte legselbeheer	13,42 ha
oppervlakte verlenging rustperiode	5,53 ha