

# Overzicht pakketten akkernatuur Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

2026



# Inhoudsopgave

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Kruidenrijke akkerranden</b>        | <b>3</b>  |
| <b>Wintervoedselakker</b>              | <b>4</b>  |
| <b>Vogelakker</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>Bloemenblok</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>Keverbank</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>Vogelgraan</b>                      | <b>10</b> |
| <b>Bodemverbetering op bouwland</b>    | <b>11</b> |
| <b>Vanggewas na uien en aardappels</b> | <b>13</b> |
| <b>Stoppelland</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Graan met kruiden</b>               | <b>15</b> |
| <b>Vogelvriendelijke eiwitgewassen</b> | <b>16</b> |
| <b>Infiltratiegreppel</b>              | <b>17</b> |

# Kruidenrijke akkerranden

## 1.1 Introductie

In akkerranden wordt geen gewas geteeld. Ze zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen. Ze worden niet bemest en niet bespoten (uitgezonderd pleksgewijs). Akkerranden brengen het mozaïekpatroon terug in het cultuurlandschap en zijn positief voor akkervogels.

## 1.2 Beheervoorwaarden:

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit ingezaaide kruiden of kruiden in combinatie met granen.
- De rand dient vóór 15 mei te worden ingezaaid.
- Geen beweiding van 1 juni tot 1 september.
- Bemesting is niet toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk, na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Meerjarige randen worden na het tweede of derde jaar opnieuw bewerkt en ingezaaid.
- Meerjarige randen worden minimaal 1x per jaar en maximaal 2x per jaar gefaseerd gemaaid. Er wordt niet gemaaid tussen 1 april en 30 juni i.v.m. de mogelijke aanwezigheid van broedvogels.
  
- Bij meerjarige randen dient het maaisel af te worden gevoerd. Het is wenselijk om het maaisel een paar dagen (maximaal een week) te laten liggen zodat zaden eruit kunnen vallen.
- Kopakkers alleen inzaaien als het gewas na 1 september wordt geoogst.

## 1.3 Pakketten

### Vergoeding per ha

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 19) Kruidenrijke akkerrand | €3.000 |
|----------------------------|--------|

Het zaadmengsel wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend.

# Wintervoedselakker

## Introductie

Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden dekking. Belangrijk is dat er op tijd gezaaid wordt, zodat de planten tot zaadzetting komen. Vogels komen in grote aantallen op deze wintervoedselveldjes af. Niet alleen zaadetende soorten (zoals geelgors, vink, kneu, keep, groenling), maar ook roofvogels (zoals torenvalk, buizerd, blauwe kiekendief, ransuil, velduil) die hier muizen en zangvogels vangen, profiteren van de wintervoedselakker.

## Beheervoorwaarden:

- De beheereenheid bestaat uit bouwland.
- De beheereenheid is minimaal 6 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,30 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.
- Minimaal 90% tot maximaal 100% van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 maart van het volgende kalenderjaar uit een mengsel met 80% zomertarwe aangevuld met granen niet zijnde mais.
- De beheereenheid dient bij voorkeur tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid. Mocht het zaad niet goed opkomen dan kunt u voor 15 mei opnieuw inzaaien.
- Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 mei tot en met 1 maart van het volgende kalenderjaar. Er vinden geen bewerkingen plaats.
- Bemesten en beweiden is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt jaarlijks opnieuw ingezaaid en kan rouleren.
- Er dient voor ca. 5% (van het gewicht) een kruidenmengsel te worden toegevoegd.
- Zaaidichtheid van de granen en kruidenmengsel is max 100 -120 kg/ha.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Pakket mag maximaal twee jaar achtereenvolgens op dezelfde beheereenheid worden ingezaaid.

## 1.4 Pakketten

## Vergoeding per ha

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| 15a) Wintervoedselakker 1 juni tot 1 maart Klei | € 2.750 |
|-------------------------------------------------|---------|

Het kruidenmengsel wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend.

# Vogelakker

## Introductie

Een vogelakker is een volveldse, (liefst meerjarige) maatregel die bestaat uit een afwisseling van stroken met een meerjarig eiwitgewas (bij voorkeur luzerne of grasklaver) en stroken ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden (braak met inzaai). Het aandeel luzerne of grasklaver in de vogelakker bedraagt ongeveer 75% van de oppervlakte, het aandeel natuurbraak 25%. De stroken met luzerne of grasklaver worden maximaal 3 à 4 keer gemaaid en kunnen worden benut als groenvoer in de veehouderij. Bij het maaibeheer wordt rekening gehouden met de broedcyclus van de veldleeuwerik. Graan- en braakstroken kunnen fungeren als wintervoedsel voor vogels en worden dus niet geoogst of gemaaid.

Vogelakkers zijn bedoeld voor roofvogels en uilen, maar ook broedende kwikstaartjes, veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken. Om goed te functioneren moeten vogelakkers bij voorkeur meerdere jaren op dezelfde plek liggen. Voor het laatste jaar kan pakketvariant b gebruikt worden, zodat in het najaar de grond bewerkt kan worden.

## Beheervoorwaarden:

Beheer pakket a en b:

- Vogelakkers liggen bij voorkeur 3-4 jaar op één plek en worden daarna verplaatst, om voldoende kwaliteit in het gewas te houden. In het laatste jaar kan pakket b worden gebruikt, zodat in het najaar kan het perceel klaar worden gemaakt voor een nieuwe teelt of vernieuwing van de vogelakker.
- De beheereenheid dient bij voorkeur tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid. Mocht het zaad niet goed opkomen dan kunt u voor 15 mei opnieuw inzaaien.
- Eventueel beweiden is alleen toegestaan met een beperkt koppel schapen in de wintermaanden en altijd in overleg met de veldcoördinator.
- De akker moet bestaan uit minimaal enkele kruidenstroken (minimaal 3).
- De oppervlakte mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk na toestemming van de veldcoördinator.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Het eiwitgewas wordt minimaal 1 x en maximaal 3 à 4 maal per jaar gemaaid en afgevoerd. Eerste keer na 25 mei. De maai interval is 45 dagen. Maaien voor 25 mei alleen met toestemming van de veldcoördinator.
  
- *Pakket a:* Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit één of meerdere van de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), bladrammenas, gras.
  
- *Pakket b:* Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één of meerdere van de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), bladrammenas, gras.

- Pakket b: Dit pakket is voor het laatste jaar van de vogelakker. De vogelakker blijft in dat laatste jaar in ieder geval in stand tot 1 september. Daarna is er tijd voor grondbewerking en evt vernieuwing of zaaien volggewas.

## **Pakketten**

## **Vergoeding per ha**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 16a) Vogelakker meerjarig              | €3.000 |
| 16b) Vogelakker meerjarig-laatste jaar | €2.800 |

Het zaadmengsel voor de natuur- en graanstroken wordt in samenspraak vastgesteld en ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend. Het eiwitgewas koopt u zelf.

# Bloemenblok

## Introductie

Bloemenblokken bieden voedsel, veiligheid en voortplantingshabitat. Vogels vinden er veilige broedgelegenheid en voedsel voor kuikens. Boerenlandvogels eten in de eerste twee weken van hun leven voornamelijk insecten. Dit eiwitrijke voedsel is essentieel voor de groei van kuikens. Daarnaast is er volop zaad te vinden in de herfst en winter én bladgroen aan het einde van de winter als de zaden op raken. Bovendien biedt de begroeiing dekking tegen predatoren en slechte weersomstandigheden. Ook vlinders, bijen en hommels profiteren van het grote aanbod van bloemen.

## Beheervoorwaarden:

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit ingezaaide kruiden of kruiden in combinatie met granen.
- Het bloemenblok dient vóór 15 mei te worden ingezaaid bij aanleg in het voorjaar. Aanleg in het najaar is ook een optie.
- Een bloemenblok ligt meerdere jaren op één plek.
- Een bloemenblok is minimaal 0,5 ha groot en 20 m breed.
- Bij aanleg en beheer uitgaan van toepassen 'best-practices' (aanleggen vals zaaibed etc.).
- Het blok wordt ingezaaid met een speciaal samengesteld mengsel, zie informatie uit [het Partridge project](#).
- Er wordt gezaaid in een lage zaaidichtheid (7 kg/ha).
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgevijs mogelijk na toestemming van de veldcoördinator
- Elk jaar wordt de helft van ieder bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. In het tweede jaar de eerste helft, in het derde jaar de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste helft. Hierdoor ontstaat er de nodige variatie in begroeiing. Let op dat er bij het halveren van het bloemenblok geen smalle stroken ontstaan. Voor 1 juni staat er zo weer een gewas.
- Bemesting van het bloemenblok is niet toegestaan.

## Pakketten

## Vergoeding per ha

|                  |         |
|------------------|---------|
| 43a) Bloemenblok | € 3.000 |
|------------------|---------|

Het zaadmengsel wordt ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend

# Keverbank

## Introductie

Een keverbank is een verhoogde strook akkerland begroeid met ruige grassen en kruiden met een smalle strook kale grond. De verhoogde strook ligt een halve meter hoger dan de omliggende grond en is drie meter breed. Door de verhoogde ligging is een keverbank warmer en droger dan het omringende akkerland, waardoor insecten, zoals loopkevers, zich er thuis voelen. Insecten kunnen er ook overwinteren.

Voor akkervogels biedt een keverbank warmte, dekking, insecten als voedsel voor kuikens en een veilige plek om te nestelen. Keverbanken bieden akkervogels (o.a. veldleeuwerik en gele kwikstaart) in de lente en zomer voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid. In de herfst en winter vinden ze er dekking.

Keverbanken zijn ook nuttig voor natuurlijke plaagbestrijding. In de lente trekken loopkevers en spinnen vanuit de keverbank het naastgelegen gewas in en vreten daar grote aantallen bladluizen, slakken en andere plagen.

## Voorwaarden

### Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit ingezaaide kruiden en braak
- Een keverbank wordt aangelegd midden in het perceel, minstens 6m vanaf de perceelsrand om geen predatoren te lokken. Zie voor werkwijze: [Partridge project](#)
- De vegetatie op het verhoogde deel is meerjarig.
- In het eerste jaar na het zaaien wordt de keverbank één of twee keer gemaaid (op 10 cm hoogte) en het maaisel wordt afgevoerd.
- De strook met groene braak parallel aan het opgehoogde deel wordt zoveel mogelijk kaal gehouden door deze strook in het groeiseizoen maximaal 2 keer te cultivateren/eggen.
- Mechanische bestrijding van plaagonkruiden is gedurende het gehele jaar pleksgewijs toegestaan.
- Chemische onkruidbestrijding is pleksgewijs mogelijk na toestemming van de veldcoördinator maar mag niet meer dan 10 % van de oppervlak zijn.

### Adviezen

- Omdat een keverbank op zichzelf een smal element is, wordt deze bij voorkeur gecombineerd met een andere maatregel, zoals een bloemenblok of een meerjarige akkerrand.

## Pakketten

## Vergoeding per ha

44a) Keverbank

€ 3.000

Het zaadmengsel wordt ingekocht door Water, Land & Dijken en per factuur met de deelnemers verrekend



# Vogelgraan

## Introductie

Vogelgraan ontwikkelt zich door het zaaien van minder zaden als een opener gewas dan bij normale graanteelt. Akkervogels houden van een minder dicht gewas en meer variatie in gewas, om in te broeden. Voor de aantrekkelijkheid kan er bij het zaaien van het graan ook kruiden als klaprooszaad en korenbloemzaad worden mee gezaaid. Dit geeft in de zomer kleur aan het perceel. en maakt op die manier het landschap aantrekkelijker. Tevens hebben ze een functie voor insecten en leveren ze zaden voor vogels.

Door de openheid in het gewas, de ontwikkeling van meer akkerkruiden en de aanwezigheid van bloeiende bloemen ontstaat er een aantrekkelijk habitat voor vogels en insecten. Een combinatie met stoppel zorgt vervolgens voor dekking gedurende het hele jaar. Het gewas wordt wel geoogst. Bij dit pakket wordt grondbewerking en gebruik van chemie beperkt.

## Voorwaarden

- Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 december uit zomertarwe of zomergerst (geen mais) met eventueel gezaaide kruiden
- Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m<sup>2</sup>, oftewel 76 kg/ha.
- Bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan.
- Mechanische onkruidbestrijding is na 15 april niet toegestaan.
- Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
- Gebruik van sleepslang bij het uitrijden van drijfmest is niet toegestaan.
- Beheereenheid mag niet worden beweide.
- De stoppel blijft na de oogst staan tot 15 december
- Grondbewerking na de oogst van graan: Oplichten van de grond (om waterbergend vermogen te vergroten) is toegestaan, dusdanig dat de stoppel in stand blijft.

## Adviezen

- Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm heeft de voorkeur voor openheid in het gewas en nestelgelegenheid voor akkervogels.
- Om onkruidproblemen te voorkomen helpt het om het beheerpakket te rouleren, zodat de grond goed bewerkt kan worden.

## Pakketten

## Vergoeding

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 40a) Vogelgraan van 15 mei tot 15 december    | € 1.750 |
| 40a 12.01) Vogelgraan van 15 mei tot 15 maart | € 2.000 |

# Bodemverbetering op bouwland

## Introductie

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of met plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden.

## Voorwaarden

- **Pakket b:** Vaste mest is opgebracht (vaste mest: dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn; besluit meststoffen 1Ai; Bijlage i uit Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Tabel I) rund (10,13), paard (25), schaap (56)), dan wel met bodemverbeteraars gericht op bodembioïlogie uit [lijst a](#) [6].
- Vaste mest en bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen wordt direct ondergewerkt (dit is een wettelijke verplichting).
- **Pakket c:** Plantresten (a), [lijst a](#) conform 6 (b) en/of andere bodemverbeteraars (c) al dan niet opgebracht, zijn ondergewerkt binnen 2 weken na aanbrengen [30].
- Plantenresten worden in één keer opgebracht en binnen twee weken na opbrengen ondergewerkt.
- Enkel bodemverbeteraars zonder dierlijke meststoffen vallen onder dit pakket (bv compost, stro, e.a.)
- **Pakket b en c:** Volg de wettelijke uitrijperiodes.
- Volg [de lijsten van toegestane meststoffen en bodemverbeteraars](#) zoals opgenomen in bijlage 4 bij de SVNL.

### Adviezen

- Bodemverbeteraars met dierlijke meststoffen passen niet in variant c, deze moeten verplicht direct na opbrengen worden ondergewerkt volgens de meststoffenwet (kan wel via variant b).
- Plantresten en bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten gemaakt. Bijvoorbeeld slootmaaisel of bermmaaisel.
- Deze pakketvarianten kunnen met verschillende eco-activiteiten cumuleren.

## Pakketten

### vergoeding per ha

|                                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| b) Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars                          | €110 |
| c) Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl. stro<br>groenbemesters en onderwerken | €300 |

## Meldingen

- Binnen 1 week uitgevoerd beheer (uitrijden ruige mest) melden, per beheereenheid via [mijnboerennatuur.nl](http://mijnboerennatuur.nl)

# Vanggewas na uien en aardappels

## Introductie

Aardappels en uien verliezen veel stikstof (N). Door een vanggewas na de teelt te zaaien wordt voorkomen dat stikstof uitspoelt naar grond en oppervlaktewater. Dit pakket kan alleen worden afgesloten wanneer er geen wettelijke verplichting is voor het zaaien van een vanggewas. In het werkgebied van Water, Land & Dijken kan dit pakket worden afgesloten omdat de akkerbouwgebieden uit kleigronden bestaat.

## Voorwaarden

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 januari tot 31 maart van het opvolgende jaar uit een vanggewas of wintergranen.
- Geschikte vanggewassen kunnen worden gekozen uit de **lijst groenbemesters/vanggewas** zoals gedefinieerd in de gewassenlijst behorende bij de Uitvoeringsregeling GLB 2023 ([lijst Groenbemesters/vanggewassen](#)).
- Dit pakket kan na teelt van aardappels en uien of andere gewassen met relatief veel N verlies.
- Het vanggewas wordt na de hoofdteelt in het najaar ingezaaid, het moet tot het volgende voorjaar tenminste tot en met 31 maart blijven staan.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het '[Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#)'.

## Pakketten

## vergoeding per ha

48a) Vanggewas na uien en aardappels € 100

# Stoppelland

## Introductie

Stoppel, met name hoge stoppel, is waardevol voor akkervogels, zeker in combinatie met andere vormen van akkervogelbeheer in de omgeving. Akkervogels vinden hierin dekking én voedsel in de winter. Als stoppel of gewasresten door de winter ongestoord kan blijven liggen is dat heel aantrekkelijk voor zaadeters als veldleeuwerik, patrijs, geelgors en kneu, maar ook voor muizeneters als torenvalk, blauwe kiekendief en uilen. Een graanstoppel die tot en met het volgende groeiseizoen blijft liggen, biedt daar bovenop opgroei en foerageergelegenheid voor akkervogels.

## Voorwaarden

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum 1 november t/m 15 maart uit graanstoppel (geen maïsstoppel).
- Gedurende de aanwezigheid van de stoppels of gewasresten wordt een rustperiode aangehouden. Bewerkingen in de oppervlakte en bemesting zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ‘Protocol gebruik herbiciden open akkerland’ bij agrarisch natuurbeheer.

### Adviezen

- Om onkruiddruk in dit beheerpakket beheersbaar te houden helpt het om het te rouleren en niet jaar na jaar op hetzelfde perceel in te zetten.
- Spontane kruiden die in de graanstoppel groeien zijn gunstig voor het ecologische doel.

## Pakketten

### vergoeding per ha

|      |                                          |       |
|------|------------------------------------------|-------|
| 14a) | Graanstoppel van 1 november tot 15 maart | € 500 |
|------|------------------------------------------|-------|

# Graan met kruiden

## Introductie

De akker bestaat uit een mengsel van graan en akkerkruiden. De akkers worden beperkt bemest (**geen kunstmest**) en ook chemische onkruidbestrijding wordt vermeden. Granen worden ruim gezaaid, zodat er ruimte is voor kruiden in de ondergroei.

De granen dragen bij aan de doelstelling klimaat. Doordat granen diepe wortels hebben, verbeteren ze de bodemstructuur die zorgt voor goede doorlaatbaarheid voor water. Tevens hebben dezelfde wortels ook een gunstig effect op de hoeveelheid koolstof in de bodem.

## Voorwaarden

- De beheereenheid bestaat vanaf 15 mei tot 15 juli voor minimaal 90% uit granen (geen maïs) en kruiden (spontane opkomst of ingezaaid).
- Geen bemesting met kunstmest, omdat dit pakket er op gericht is een open gewas te telen met een ondergroei van kruiden.
- Dun zaaien (80-100 kg/ha).
- Geen insecticiden en geen chemische onkruidbestrijding gedurende het groeiseizoen.
- Buiten het groeiseizoen (na de oogst) is chemische onkruidbestrijding alleen pleksgewijs toegestaan conform het '[Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#)' bij agrarisch natuurbeheer.
- Er wordt een rustperiode aangehouden van 15 mei tot 15 juli. Bewerkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief.
- Graan kan worden geoogst.

## Pakketten

## Vergoeding per ha

|     |                   |         |
|-----|-------------------|---------|
| 18) | Graan met kruiden | € 1.000 |
|-----|-------------------|---------|

# Vogelvriendelijke eiwitgewassen

## Introductie

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor leeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken en kwartelkoning.

Om te broeden wordt de eerste maaibeurt tot minimaal 1 juni. In juni-juli wordt een periode van minimaal 7 weken rust aangehouden tussen de eerste en tweede maaibeurt in. Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats.

## Voorwaarden

### Pakketvarianten

- 50a Luzerne 1 juni -15 augustus; maaien na 7 weken
- 50c erwten of veldbonen inzaai najaar 1 juni tot 15 juli
- 50d zomerveldbonen inzaai vroege voorjaar 1 juni tot 15 augustus

- Variant a: De periode dat luzerne er staat is het minimum, dit biedt gelegenheid voor inzaaien en evt. na het laatste jaar het gewas te vernieuwen.
- Variant a: Maairegime: eerste maaibeurt niet voor 1 juni, tweede maaibeurt na de rustperiode.
- Variant a: Voor broedhabitat ná de eerste snede wordt minimaal 7 weken rust tot de tweede maaibeurt gehouden.
- Variant a en b: Direct na de eerste snede eventueel bemesten met vaste mest.
- Chemische onkruidbestrijding alleen toegestaan conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland'
- Voor gebruik fungicide (tegen chocoladevlekziekte) neem eerst contact op met veldcoördinator

## Pakketten

## Vergoeding per ha

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| 50a) Luzerne 1 juni -15 augustus          | € 1.500 |
| 50c) erwten of veldbonen inzaai najaar    | € 1.750 |
| 50d) zomerveldbonen inzaai vroeg voorjaar | € 1.250 |

# Infiltratiegreppel

## Introductie

De aanleg van een infiltratiegreppel zorgt er voor dat water dat van een perceel (bouwland of grasland) spoelt niet de sloot in stroomt, maar via de infiltratiegreppel de grond in zakt. Dit voorkomt afspoeling van water, grond, nutriënten en bestrijdingsmiddelen.

De greppel wordt in overleg met het waterschap aangelegd. Het beheer kan gecombineerd worden met een bufferstrook langs bouwland of grasland. Afhankelijk van het type rand en/of het aangrenzende grondgebruik is ligt de greppel op een bouwlandbuffer of een graslandbuffer.

## Voorwaarden

- Jaarlijks aanleggen van een greppel met minimale breedte 15 cm en minimale diepte 30 cm ten behoeve van infiltratie. Is aanwezig van 1 juni tot 15 augustus [37].
- De infiltratiesleuf wordt parallel aan de sloot aangelegd op een afstand van minimaal 2 m vanaf de insteek.
- De infiltratiegreppel dient zodanig aangelegd en onderhouden te worden dat de greppel een boven breedte heeft van minimaal 15 cm en een diepte van 30 tot 50 cm.
- Vrijkomende grond dient richting het perceel gespoten te worden, van de sloot/watergang af.
- De aanleg en het onderhoud van de greppel moet zodanig gebeuren dat de greppel niet in directe verbinding komt met het oppervlaktewatersysteem.
- Dit pakket kan afgesloten worden binnen de categorieën Water en Klimaat.

## Pakketten

## Vergoeding per ha

47a) Infiltratiegreppel

€ 1.200

## Projectdetails

Projectperiode: 2023-2028  
Opgesteld door: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken  
Financier: Europese Unie, Provincie Noord-Holland, HHNK  
Contactpersoon: Grada Kwantes en Marieke Stam, vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken  
Versie 05-01-2026